

## **ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL SUPERIOR (EGD)**

- Si tiene alguna pregunta acerca de estas instrucciones, por favor póngase en contacto con nuestra oficina al 520-722-0744.
- Si usted esta programado para su examen en Mesquite Surgery Center, Por Favor Llegue 30 minutos antes de la hora de la cita.
- Si usted esta programado en TMC, Saint Joseph's Hospital o Northern Cochise Hospital: Llegue 1 hora antes de la cita.

Fecha de la Cita: \_\_\_\_\_ Hora de la Cita: \_\_\_\_\_ Hora De Llegada: \_\_\_\_\_

## **INSTRUCCIONES DE PREPARACION PARA LA ENDOSCOPIA SUPERIOR (EGD)**

### **5 DIAS ANTES DEL EXAMEN**

- **Usted Debe dejar de Tomar Los Sigüientes Medicamentos:** (si esta bien con su doctor primario o cardiólogo). Aspirina. NSAIDS ( Advil, Ibuprofen, Naproxen, Aleve), Coumadin, Heparina, Plavix, Pradaxa u otros anticoagulantes. Si debe continuarlos, por favor háganos saber.
- Tylenol es aceptable para tomar durante este tiempo.

### **1 DIA ANTES DEL EXAMEN**

- **NO** tome ningún medicamento oral para la diabetes.
- Usted **NO** puede tener nada de comer o beber después de la 12:00 media noche la noche antes del procedimiento.

### **EL DIA ANTES DE SU EXAMEN**

- **NO consuma alimentos solidos o líquidos para beber al menos que sea agua.**
- Usted puede seguir bebiendo agua hasta 4 horas antes de su examen.
- Tomar cualquier medicamento para el corazón o la presión arterial como de costumbre. Únicamente con agua.
- **NO** tome ningún medicamento oral para la diabetes la mañana de su examen.
- Usted puede volver a tomar medicamentos orales para la diabetes DESPUES de su procedimiento.
- **Dependientes diabéticos de Insulina** deben tomar ½ dosis habitual de insulina el día de su examen. Continúe supervisando el azúcar en la sangre como de costumbre.
- **Deje de beber cualquier liquido 4 horas antes del examen.**
- **Nada mas que comer ni beber hasta después del procedimiento.**
- Por favor use zapatos cómodos (sin tacones) y ropa cómoda, traiga un par de calcetines calientes.
- Por favor traiga una lista de sus medicamentos con usted.
- **ALGUIEN TIENE QUE LLEVARLO A SU CASA DESPUES DE SU EXAMEN.**
- Usted no puede manejar por el resto del día.

\*\* **Pacientes Femeninas:** Si usted experimenta incontinencia de esfuerzo al toser y/o estornudar puede que desee usar un protector de panty o almohadilla durante su procedimiento. \*\*