

## ENDOSCOPIA INSTRUCCIONS

Mesquite Gastroenterology & Surgery Center 7445 E. Tanque Verde Road Tucson, Arizona 85715 Phone: 520-722-0929 Fax: 520-722-0745 www.mesquitegsc.com	Tucson Medical Center TMC GI 5301 E. Grant Rd Tucson, Arizona 85712 Phone: 520-327-5461	St. Joseph's Hospital St. Joseph GI 350 N. Wilmot Rd Tucson, Arizona 85711 Phone: 520-873-3000
--	---	--

Usted està programado para una endoscopia con el Dr. Arenas en la siguiente instalación:

MSC

TMC GI

St Joseph GI

**Fecha de la cita:** \_\_\_\_\_ **Hora de la cita:** \_\_\_\_\_ **Llegue 30 mins antes; a la(s):** \_\_\_\_\_

Debes tener un conductor responsable que te lleve a casa después del procedimiento. **ESTO NO INCLUYE** taxi o UBER. Los Servicios de Transporte Medico son aceptables. Si no puede hacer arreglos para que una persona responsable lo lleve a casa, notifíquelo a Mesquite Gastroenterology Surgery Center. **Si llega a Mesquite sin transporte aceptable, su procedimiento se pospondrà.**

- Llegue media hora antes de la hora de su procedimiento. Si està programado en TMC llegue 1 hora antes de la hora de su procedimiento.

Si està tomando **FENTERMINA**, debe dejar de tomarla 2 semanas antes de su procedimiento.

<p style="background-color: yellow; padding: 2px;"><b>5 DIAS ANTES DE SU EXAMEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Debe dejar de tomar los siguientes medicamentos:</b> (Si su médico de atención primaria o cardiólogo lo autoriza): Aspirina, NSAIDS (Advil, Ibuprofen, Celebrex, Naproxeno, Meloxicam, Diclofenac Aleve) Coumadin, Eliquis, Heparina, Pradaxa, Plavix, Clopidogrel, Xarelto, u otros anticoagulants. Si debe continuar, infórmenos.</li> <li><b>DETENGA</b> cualquier agente de abultamineto y suplementos vitamínicos: Metamucil, Citrucel, Gemfibrozil, Ginseng, Ginkgo, tabletas de ajo, Vitamina E, Multivitaminas, aceite de pescado y suplementos de hierro.</li> <li><b>Tylenol es acetable tomar durante este tiempo.</b></li> <li><u>Si es diabético y toma Steglatro, deje de tomar 4 días antes del procedimineto. Si toma Invokana, Farxiga o Jardiance, deje de tomarlo 3 días antes del procedimineto.</u></li> </ul>
<p style="background-color: yellow; padding: 2px;"><b>EL DÍA ANTES DE SU EXAMEN</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No puedes comer nada después de las 12 de la medianoche de la noche anterior a tu procedimiento.</li> <li>Tome cualquier medicamento para el corazòn, presión arterial, convulsions u otros medicamentos necesarios 4 horas antes del procedimiento. (con agua està bien)</li> <li><b>DEJE DE BEBER LÍQUIDOS 4 HORAS ANTES DE SU EXAMEN!!</b></li> <li><b>NO</b> mastique ningún chicle, chupe caramelos duros, mentas o use tabaco para masticar.</li> <li>Los diabéticos dependientes de insulina deben tomar la mitad de la dosis el día del examen.</li> <li>Por favor traiga una lista de sus medicamentos con usted.</li> <li>Por favor venga preparado para pagar su copago para el procedimiento ambulatorio. Consulte con su seguro para su cantidad requerida.</li> </ul>